



Savus ieteikumus acāliju kopšanā sniedz LU Botāniskais dārzs, kuram pieder lielākā acāliju kolekcija Latvijā.

Ziedošo acāliju kopšana:

- Ziedošas acālijas tur pēc iespējas vēsākās (ap +15°C), gaišās, labi vēdinātās telpās. Vēdinot ziemā ir jāuzmanās, lai aukstā gaisa plūsma neapsaldētu ziedošos augus. Ja telpās ir virs +20° C, acālijas ātri nozied.
- Acālijām jāuztur liels gaisa un substrāta mitrums. Pārlietu siltās un sausā telpās (ar centrālapkuri) acālijām vērojama stipra lapu biršana. Lai tas nenotiktu, acālijas regulāri bagātīgi jālej. Ziedēšanas laikā tās nerasina, jo dažām šķirnēm, rasināšanas ietekmē, vietās, kur uzkrīt ūdens pilieni, ziedi kļūst plankumaini.
 - Substrātam, kurā aug acālijas, jābūt mitram, bet ne slapjam.
 - Jālej ar mīkstu, vislabāk ar lietus vai kūstoša sniega ūdeni.
 - Laistāmajam ūdenim jābūt skābam (pH 4,5-5,5). Ja tas ir neitrāls vai pat sārmainis, to paskābina ar kādu no organiskajām skābēm, piemēram, skābeņskābi, citronskābi vai askorbīnskābi, ņemot 3-4 g (1 tējkaroti) uz 10 litriem ūdens.
 - Ar skābinātu ūdeni acālijas lej 1-2 reizes mēnesī. Ja to dara biežāk, acāliju lapu gali kļūst zilgani, kas norāda, ka substrāta reakcija ir pārāk skāba (pH zemāks par 3,5).

Ja sakņu kamols iežuvis:

- Ja acālija tikusi iekaltēta, tad pat pēc ūdens režīma noregulēšanas tām novīst un nobirst ne tikai ziedi un ziedpumpuri, bet arī lapas!
- Ja sakņu kamols ir stipri izžuvis, tad acālijas ar visu podu ir jāizmērcē, līdz viss sakņu kamols piesūcas ar ūdeni.
- Nedaudz iekaltēta un apvītusi acālija pēc „atdzeršanās” parasti atgūst normālu izskatu.
- Profilakses nolūkā reizi nedēļā acāliju podus ieteicams uz kādu stundu iemērkāt līdz malām ūdenī (spainī, bļodā, vannā). Pēc tam liekajam ūdenim ļauj notecēt un tālāk turpina liet pēc vajadzības.

Pēc ziedēšanas:

- Acālijas tur pēc iespējas vēsākās, gaišākās telpās, bagātīgi rasina un lej.
- Nolasa vecos, sakaltušos ziedus.
- Ne vēlāk kā līdz maija sākumam veido krūmu, mazliet saīsinot visus dzinumus (no katra vecā dzinuma attīstīsies 2-4 jauni dzinumi).
- Mājas apstākļos acālijas pārstāda ik pēc 2 gadiem – tas jādara tūlīt pēc noziedēšanas un apgriešanas.
- Ieteicamais substrāts ir sfagnu kūdra un pussatrūdējušu priežu skuju maisījums 1:1; vienam litram substrāta pievieno 1g krīta.
- Acālijas pārstāda tādā pat dziļumā, kādā tās augušas iepriekš.
- Vasarā, pēc vēlo pavasara salnu izbeigšanās, apmēram jūnija vidū, acālijas izstāda dārzā, pusēnā, augus ar visu podu vai bez tā ierok zemē.
- Lai acālijas izveidotu ziedpumpurus un nākamajā ziemā bagātīgi ziedētu, tās intensīvi jābaro, jāmēslo 2-3 x mēnesī ar fizioloģiski skābajiem mēslošanas līdzekļiem vai arī ar speciālajiem acāliju minerālmēsļu maisījumiem.

Kā uzziedināt no jauna:

- Acālijas ienes atpakaļ telpās, kad āra temperatūra naktīs pazeminās zem +5°C.
- Pēc ienešanas telpās, acālijas jātur gaišās, labi vēdinātās telpās, lai labāk nobriestu ziedpumpuri, un jāturpina lapu rasināšana.
 - Temperatūrai telpās jābūt ap +10°C. Ja temperatūra ir augstāka, ziedpumpuri nespēj līdz galam attīstīties, tie kļūst brūni un atmirst.
 - Pēc aukstuma perioda iziešanas sāk acāliju uzziedināšanu, temperatūru paaugstinot līdz +12°C .. +15°C.
 - Vēlīnās šķirnes nedrīkst uzziedināt agri, jo tad iegūst ļoti zemas kvalitātes ziedus.